

# Lorex<sup>®</sup>

Loratadina

1 mg/ml Jarabe

10 mg Comprimidos

especialidades



Dollder c.a.

**FÓRMULA:** Cada ml contiene: Loratadina 1 mg; Azúcar 600 mg; vehículo c.s.p.  
Cada comprimido contiene: Loratadina 10 mg; Lactosa 107,30 mg; Excipientes c.s.p.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**INDICACIONES:** Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica, urticaria y otras afecciones dermatológicas alérgicas, como dermatitis atópica.

**POSOLÓGIA:** A criterio del médico tratante. Jarabe: Adulto: 10 mg (2 cucharaditas) al día. Niños mayores de 2 años con peso menor de 20 Kg.: 2,5 mg/día. (2,5ml). Niños mayores de 2 años con peso mayor de 20 Kg: 5 mg / día. (5ml). Comprimidos: Adultos: 10 mg al día.

**ADVERTENCIAS:** No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable. Manténgase fuera del alcance de los niños. No exceda la dosis prescrita. El jarabe contiene azúcar, no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la sacarosa (equivalente a todos los azúcares). Los comprimidos no deben administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa.

**PRECAUCIONES:** Pacientes con alteraciones del funcionalismo hepático/ renal. Pacientes que reciban terapia concomitante con antimicrobianos macrólidos y/o derivados imidazólicos. Al efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, se debe suspender aproximadamente 48 horas antes el tratamiento con Loratadina, ya que puede inhibir o disminuir la reactividad dérmica. Adminístrese el jarabe con precaución en pacientes diabéticos.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedades cardíacas congénitas, hipertensión arterial. Insuficiencia hepática, hipertiroidismo.

**EFFECTOS ADVERSOS:** Neurológicas: Mareos, tinitus, astenia, incoordinación, visión borrosa, euforia, cefalea, insomnio y temblores. Gastrointestinales: Anorexia, náuseas, vómito, estreñimiento, diarrea. Otras: Xeroftalmia, tos, disuria, palpitaciones, hipotensión.

**INTERACCIONES:** Con depresores del Sistema Nervioso Central (neurolépticos, benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos) y con fármacos que potencian los efectos anticolinérgicos (IMAO y antidepresivos tricíclicos) aumentando el efecto sedante.

**CONSERVACIÓN:** Consérvese a temperatura menor a 30°C.

**VENTA SIN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA.**

**PRESENTACIÓN:** Frasco con 60 ml. E.F. 27.541/10. Estuche conteniendo 10 comprimidos. E.F. 27.233/10.

**FARMACÉUTICO PATROCINANTE:** Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.

RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.

Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.

Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23765

TIRO

FECHA: 31 - 07 - 13  
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm  
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.