

# Muclar®

Ambroxol / Loratadina

30 mg - 5 mg/5 mL Jarabe



**FÓRMULA:** Cada 5 mL contiene:  
Ambroxol Clorhidrato..... 30,00 mg  
Loratadina..... 5,00 mg  
Azúcar..... 600,00 mg  
Vehículo..... c.s.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Vía Oral.

**INDICACIONES:** Tratamiento de las afecciones respiratorias que cursan con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales asociados a procesos alérgicos.

**POSOLOGÍA:** Niños mayores de 2 años con peso menor de 30 Kg: 2,5 mL (Loratadina 2,5 mg - Ambroxol 15 mg) cada 12 horas. Adultos y niños mayores de 2 años con peso mayor de 30 Kg: 5 mL (Loratadina 5 mg - Ambroxol 30 mg) cada 12 horas.

**ADVERTENCIAS:** Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la sacarosa. Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución de la capacidad de concentración mental y de la actividad refleja.

**PRECAUCIONES:** Evítese actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinarias. La ingesta concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso central aumentan el riesgo de accidentes. Los bloqueante H1 interfieren con las pruebas de sensibilidad cutánea, por lo que previo a la realización de las mismas debe suspenderse la administración de antihistamínicos. Debe realizarse pruebas de funcionalismo hepático y renal. Pacientes que reciban terapia concomitante con antimicrobianos macrólidos y/o derivados imidazólicos. Al efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, se debe suspender aproximadamente 48 horas antes el tratamiento con este producto, ya que la Loratadina puede inhibir la reactividad dérmica. Este producto contiene sacarosa, adminístrese con precaución en pacientes diabéticos.

**EFFECTOS ADVERSOS:** Neurológicas: Mareos, astenia, tinitus, incoordinación, visión borrosa, diplopía, euforia, intranquilidad, insomnio y temblor, somnolencia. Gastrointestinales: Anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea. Otros: Xerostomía, xerausis de fauces y vías respiratorias, tos, poliaquiuria, disuria, palpitaciones, hipotensión arterial, cefalea, boca seca.

**INTERACCIONES:** Con depresores del SNC (neurolépticos, benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos) y con fármacos que potencian los efectos anticolinérgicos (MAO y antidepresivos tricíclicos), aumentando el efecto sedante. Alcohol etílico, barbitúricos y teofilina.

TIRO

# Muclar<sup>®</sup>

Ambroxol / Loratadina

30 mg - 5 mg/5 mL Jarabe



**CONTRAINDICACIONES:** Niños menores de 2 años. Pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitas, hipertensión arterial, insuficiencia hepática, enfermedades cardíacas congénitas, hipertiroidismo.

**CONSERVACIÓN:** Consérvese en lugar fresco y seco, a temperatura inferior a 30°C.

**PRESENTACIÓN:** Estuche conteniendo frasco con 60 mL. E.F. 39.077/18.

**FARMACÉUTICO PATROCINANTE:** Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.  
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.  
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.  
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337. [www.dollder.net](http://www.dollder.net)

23731-2

RETIRO

FECHA: 01 - 02 - 11    CORRECCIÓN: 17 - 05 - 22  
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm  
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.