

Talerc®

Cetirizina Diclorhidrato

10 mg Comprimidos

especialidades



Dollder c.a.

FÓRMULA: Cada comprimido contiene:
Cetirizina Diclorhidrato..... 10,00 mg
Lactosa Monohidrato..... 82,45 mg
Almidón de Maíz..... 32,50 mg
Excipientes..... c.s.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Tratamiento de rinitis y conjuntivitis estacionales, rinitis alérgicas perennes, prurito y urticaria alérgica. Antihistamínico.

POSOLOGÍA: Niños de 2 a 6 años: 0,1 mg a 0,3 mg/kg/día. Niños mayores de 6 años y adultos: 10 mg/día.

ADVERTENCIAS: No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución de la capacidad de concentración mental y de la actividad refleja. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa.

PRECAUCIONES: Evítese actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental, como manejo de vehículos u otros tipos de maquinarias. La ingesta concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso central aumentan el riesgo de accidentes. Los bloqueantes H1 interfieren con las pruebas de sensibilidad cutánea, por lo que previo a la realización de las mismas debe suspenderse la administración de antihistamínicos. Deben realizarse pruebas de funcionalismo hepático y renal.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Niños menores de 2 años. Pacientes con glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus.

REACCIONES ADVERSAS: Neurológicas: mareo, astenia, incoordinación, visión borrosa, diplopía, euforia, intranquilidad, insomnio, tic, crisis oculogíras, discinesia, temblor, alucinaciones, agitación, confusión, depresión, cefalea. Gastrointestinales: Anorexia, náusea, vómito, estreñimiento o diarrea. Cardiovasculares: Palpitaciones, hipotensión arterial. Otras: Xerostomía, Xerausis de fauces y vías respiratorias, tos, polaquiuria, disuria, enuresis. Somnolencia, fatiga, boca seca, mareos.

INTERACCIONES: Alcohol Etílico, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos y otros depresores del Sistema Nervioso Central.

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura menor de 30°C, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN: Estuche por 10 comprimidos. E.F. 32.057/10.

FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.

RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.

Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.

Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23777

TIRO

FECHA: 28 - 07 - 11 CORRECCIÓN: 18 - 10 - 11
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.