

Talerc®

Cetirizina Diclorhidrato

10 mg/ml Solución Oral Gotas

especialidades



Dollder c.a.

FÓRMULA: Cada ml contiene:

Cetirizina Diclorhidrato..... 10 mg
Sucralosa..... 1 mg
Propilenglicol..... 50 mg
Vehículo..... c.s. 15 ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Tratamiento de rinitis y conjuntivitis estacionales, rinitis alérgicas perennes, prurito y urticaria alérgica. Antihistamínico.

POSOLÓGIA: Niños de 2 a 6 años: 0,1 mg a 0,3 mg/Kg./día. Dosis Máxima 5 mg día. Niños mayores de 6 años: 10 mg/día. Adultos: 10 mg/día. El gotero dispensa 30 gotas por ml, cada 15 gotas equivalen a 5 mg y 30 gotas equivalen a 10 mg.

ADVERTENCIAS: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que a criterio médico el balance riesgo beneficio sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia mientras dure el tratamiento. No administrar a niños menores de 2 años. Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución de la capacidad de concentración mental y de la actividad refleja. Durante su administración evítese actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental. Con el uso de este producto no ingiera bebidas alcohólicas, ni sedantes. No descarte el estuche. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto contiene Sucralosa.

PRECAUCIONES: Durante su administración, evítese trabajos que impliquen coordinación y estados de alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinarias. La ingesta concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso central aumentan el riesgo de accidentes. Los bloqueantes H1 interfieren con las pruebas de sensibilidad cutánea, por lo que previo a la realización de las mismas debe suspenderse la administración de antihistamínicos. Deben realizarse pruebas de funcionalismo hepático y renal. Este producto contiene Sucralosa y debe administrarse con precaución en pacientes diabéticos.

EFFECTOS ADVERSOS: Neurológicas: mareo, astenia, incoordinación, visión borrosa, diplopía, euforia, intranquilidad, insomnio, tic, crisis oculógiras, discinesia, temblor, alucinaciones, agitación, confusión, depresión, cefalea. Gastrointestinales: Anorexia, náusea, vómito, estreñimiento o diarrea. Cardiovasculares: Palpitaciones, hipotensión arterial. Otras: Xerostomía, Xerausis de fauces y vías respiratorias, tos, polaquiuria, disuria, enuresis Somnolencia, fatiga, boca seca, mareos. En niños puede presentar agitación.

INTERACCIONES: Alcohol Etílico, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos y otros depresores del Sistema Nervioso Central.

CONTRAINDICACIONES: Alergia a la Cetirizina y a los otros componentes de la fórmula. Pacientes con glaucoma, estenosis pilórica, retención urinaria, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus. Niños menores de 2 años.

TIRO

FECHA: 28 - 07 - 11 CORRECCIÓN: 18 - 10 - 11
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.

Talerc[®]

Cetirizina Diclorhidrato

10 mg/ml Solución Oral Gotas

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura menor de 30°C, en lugar fresco.

PRESENTACIÓN: Frasco por 15 ml de 10 mg/ml. E.F. 33,286/11.

FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

especialidades

Dollder c.a.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23791

RETIRO

FECHA: 28 - 07 - 11 CORRECCIÓN: 18 - 10 - 11
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

 asesores gráficos F&S c.a.