

Vizerul[®]

Ranitidina Clorhidrato

75 mg Comprimidos Recubiertos



FÓRMULA: Cada comprimido recubierto contiene:
Ranitidina Clorhidrato 83,694 (equivalente a 75 mg Ranitidina base); excipientes c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Comprimidos Orales.

INDICACIONES: Alivio sintomático de la pirosis (ardor estomacal).

POSOLÓGIA: Dosis Recomendada.
Adultos y mayores de 16 años: 75 mg 2 veces al día por 24 horas.

ADVERTENCIAS: Si los síntomas persisten con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. Si está embarazada o en período de lactancia consulte al médico antes de usar este producto.
En caso de administrarse con otros medicamentos, debe consultarse al médico.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No exceda la dosis recomendada. No use en menores de 16 años.

INTERACCIONES: No se administre conjuntamente con ketoconazol.

CONTRAINDICACIONES: No se administre en pacientes con historia de porfiria aguda, ni en pacientes alérgicos a la Ranitidina.

CONSERVACIÓN: Consérvese a temperatura entre 15°C y 30°C en lugar seco y al resguardo de la luz.

PRESENTACIÓN: Estuche con 10 comprimidos de 75 mg. E.F. 30.487/10.

VENTA SIN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA.

FARMACÉUTICO PATROCINANTE: Dra. María Alcira Rivero Prieto.

Producto de Especialidades DOLLDER, C.A.
RIF.: J-00117472-9. Caracas - República Bolivariana de Venezuela.
Para mayor información comunicarse con la Dirección Médica de Especialidades Dollder, C.A.
Teléfonos: (0212) 400.54.00 ó al 0800 DOLLDER / 0800 3655337

23753

TIRO

FECHA: 10 - 06 - 11 CORRECCIÓN: 03 - 08 - 11
TAMAÑO: 125 (ancho) x 145 (alto) mm
COLOR: Negro

asesores gráficos F&S c.a.